



Patient Education:

Divertículo de Meckel

Elsevier Interactive Patient Education ©2016 Elsevier Inc

Divertículo de Meckel

(Meckel Diverticulum)

El divertículo de Meckel es una bolsa anormal que se encuentra en el intestino delgado. A menudo está presente desde el nacimiento (*anomalía congénita*). El intestino delgado es la porción del tubo digestivo que recibe los alimentos del estómago. El divertículo de Meckel se forma en la porción inferior del intestino delgado.

Durante la gestación, un conducto conecta el intestino delgado con la estructura tubular que brinda nutrición y da sustento al bebé (*cordón umbilical*). Normalmente, este conducto se desconecta y desaparece después del segundo mes de gestación. Si una parte del conducto queda adherida al intestino delgado, puede formar una bolsa diverticular de Meckel. En algunos casos, también puede haber tejidos anormales en la bolsa similares a los del páncreas o el estómago.

CAUSAS

La causa del divertículo de Meckel es un defecto del conducto en el intestino delgado.

SIGNOS Y SÍNTOMAS

En la mayoría de los casos, el divertículo de Meckel nunca produce síntomas. Estos se presentan cuando el divertículo causa hemorragia o inflamación. Además, los síntomas pueden aparecer si hay una perforación (*orificio*) o una obstrucción (*oclusión*) en el intestino. Entre los síntomas se pueden incluir los siguientes:

- Dolor de estómago.
- Náuseas y vómitos.
- Estreñimiento.
- Fiebre.
- Meteorismo.
- Materia fecal con sangre.

DIAGNÓSTICO

El médico puede diagnosticar el divertículo de Meckel durante un estudio por imágenes al que usted se someta por otro problema digestivo. El médico puede sospechar la presencia del divertículo de Meckel si hay signos y síntomas de la afección. El médico le hará un examen físico. Este puede incluir pruebas de diagnóstico por imágenes, como las siguientes:

- Una gammagrafía con tecnecio (*gammagrafía del divertículo de Meckel*). En este estudio, se inyecta el elemento químico tecnecio en el torrente sanguíneo. Luego se realiza un tipo de radiografía para controlar si la bolsa diverticular de Meckel se llena de tecnecio.
- Tomografía computarizada.

TRATAMIENTO

El tratamiento del divertículo de Meckel depende de los síntomas. Si no tiene síntomas, es posible que el tratamiento no sea necesario. Si tiene hemorragia, el médico puede recomendar que se someta a una cirugía para extirpar el divertículo y, posiblemente, una pequeña porción del intestino delgado.

SOLICITE ATENCIÓN MÉDICA SI:

- Tiene fiebre.
- Tiene estreñimiento.
- Los síntomas empeoran.
- Presenta nuevos síntomas.

SOLICITE ATENCIÓN MÉDICA DE INMEDIATO SI:

- Siente un dolor abdominal intenso.
- Tiene vómitos persistentes.
- Observa sangre oscura o de color rojo brillante en las heces.

Esta información no tiene como fin reemplazar el consejo del médico. Asegúrese de hacerle al médico cualquier pregunta que tenga.

Document Released: 09/27/2006 Document Revised: 01/08/2016
Elsevier Interactive Patient Education ©2016 Elsevier Inc.